

# Curathane<sup>TM</sup>

## Etiqueta Web - Perú

FUNGICIDA AGRÍCOLA POLVO MOJABLE - WP

### Composición:

Mancozeb .....	640 g/Kg
Cymoxanil .....	80 g/Kg
Aditivos .....	280 g/Kg

Registro N° 350-97-AG-SENASA

Titular del Registro: Dow Perú S.A. Arias Aragüez 250 Lima 18-Perú Teléfono 2084702

FABRICADO POR:  
**DOW AGROSCIENCES DE COLOMBIA S.A.**  
Transversal 18 No. 96-41 Piso 7°.  
Bogotá, Colombia

DISTRIBUIDO POR:  
**ARIS INDUSTRIALES S.A.**  
Av. Industrial 491. Telf. 336-5428, Fax 336-7473  
Lima - Perú

 Dow AgroSciences



NO EXPLOSIVO

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

® <sup>TM</sup> Marca de The Dow Chemical Company  
("Dow") o una compañía afiliada de Dow

**LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO**

# Curathane™

## Etiqueta Web - Perú

FUNGICIDA AGRÍCOLA POLVO MOJABLE - WP

### INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

**Curathane™** es un fungicida con acción preventiva y de post-infección cuando el hongo está en incubación. Además, posee actividad sistémica local, lo cual mejora su efecto especialmente en periodos de alta presión de la enfermedad. Su forma de empleo es en aspersión foliar ó mezclado con la semilla en arroz.

**Preparación:** Disuelva completamente la cantidad de **Curathane™** a usar en un balde y luego deposítelo en el tanque de mezcla que contenga agua hasta  $\frac{3}{4}$  o la mitad, complete el volumen de agua y agite hasta que la mezcla sea homogénea. Agite la mezcla cada vez que vaya a llenar el equipo.

**“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”**

### CUADRO DE USOS

CULTIVO	ENFERMEDADES N. Común / Agente causal	DOSIS g/200 L	Periodo de carencia (días)	LMR (ppm)
PAPA	Hielo o rancha / <i>Phytophthora infestans</i>	500 - 1000	8	0.05
TOMATE	Hielo fungoso / <i>Phytophthora infestans</i>	500 - 1000	8	0.05

#### Impregnación de semillas

ARROZ

“Quemado” / *Pyricularia oryzae*

2 g/kg semilla

“Manchado de la semilla” /  
*Helminthosporium* sp, *Alternaria* sp,  
*Nigrospora* sp, *Curvularia* sp.

\*L.M.R.: Límite máximo de residuos en ppm

#### FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

En el cultivo de arroz, se hace una única aplicación (impregnación) de la semilla antes de la siembra • En el cultivo de papa, se harán no más de cuatro aplicaciones por campaña, siendo lo más común dos aplicaciones como máximo. Las aplicaciones se



# Curathane™

## Etiqueta Web - Perú

### FUNGICIDA AGRÍCOLA POLVO MOJABLE - WP

harán hasta un mes antes de la cosecha con un intervalo no menor de tres semanas entre una aplicación y otra, alternándose de preferencia con fungicidas de diferente modo de acción • En tomate no se excederán de cuatro aplicaciones/campaña, siendo una aplicación lo más frecuente, alternada también con el uso de fungicidas de diferente modo de acción. Es más frecuente su uso durante el llenado y la maduración del fruto.

#### PERÍODO DE REINGRESO:

Se recomienda esperar 24 horas después de la aplicación para reingresar a un campo tratado.

#### COMPATIBILIDAD:

**Curathane™** es compatible con los plaguicidas de uso en el mercado. Si el producto acompañante de la mezcla aumenta el pH del agua por encima de 8.5, entonces la fracción correspondiente al cymoxanil sufre degradación. En el caso de que se desconozca la compatibilidad hay necesidad de hacer una prueba previa de su uso.

#### FITOTOXICIDAD:

No produce fitotoxicidad cuando se usa según las recomendaciones aquí dadas.

#### RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas.



# Curathane<sup>TM</sup>

## Etiqueta Web - Perú

FUNGICIDA AGRÍCOLA POLVO MOJABLE - WP

### LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

**MANTÉNGASE BAJO LLAVE,  
FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**

### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- El producto es irritante para los ojos, la piel o el aparato respiratorio.
- El producto es nocivo por ingestión, contacto con la piel o por inhalación.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

### MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Después de usar el contenido destruya este envase y deposítelo en el sitio destinado por las autoridades para este fin.

### PRIMEROS AUXILIOS

En caso de ingestión, dé a beber 2 vasos de agua.  
En caso de contacto del producto con los ojos lavarse con abundante agua durante 15 minutos y si el contacto fuera con la piel, lavarse con agua y jabón.

En caso de emergencia llamar a CICOTOX 0800-13-040, CISPROQUIM 0800-50-847 ó Aló EsSalud 0801-10-200

**NOTA AL MÉDICO:** El tratamiento es sintomático. No existe antídoto específico.

### MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. Mantener a los animales fuera del área tratada.

No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.

En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para tal fin.

