

Fortress™

Etiqueta Web - Perú

FUNGICIDA AGRÍCOLA SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

Composición:

Quinoxifen 250 g/L
Aditivos c.s.p. 1L

Registro No: 682-SENASA

Titular del Registro: Dow Perú S.A. Arias Aragüez 250 Lima 18-Perú Teléfono 2084702

FABRICADO POR:
Dow AgroSciences Limited
Estuary Road
King's Lynn
Norfolk PE30 2JD
Inglaterra

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:
BASF Peruana S.A.
Av. R. O. Benavides No 5915 - Callao
Casilla 3911 Lima 100, Perú
Tel: (01) 5132500, Fax: (01) 5132518

 **DOW**

Dow AgroSciences

 **BASF**

The Chemical Company

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

® TM Marca de The Dow Chemical Company
("Dow") o una compañía afiliada de Dow

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

Fortress™

Etiqueta Web - Perú

FUNGICIDA AGRÍCOLA SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

Fortress™, es un fungicida formulado de la clase de las phenoxyquinolinas, a base de Quinoxyfen y que tiene acción preventiva. Llénese el tanque hasta la mitad con agua y agréguese el **Fortress™** agitando continuamente. Agréguese el resto de agua agitando. Aplíquese **Fortress™** en forma de aspersión con la cantidad suficiente de agua para cubrir uniformemente el follaje de las plantas, según las dosis anotadas en el cuadro adjunto.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CUADRO DE USOS

CULTIVO	Enfermedad		DOSIS L/ha	P.C.* (días)	L.M.R.* (p.p.m.)
	Nombre común	Nombre científico			
Capsicum annum	Oidio	Leveillula taurica	0.3	3	1

P.C.: Periodo de carencia en días

L.M.R.: Límite Máximo de residuos en ppm.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Se recomienda no realizar más de 2 aplicaciones/campaña/año. El intervalo de aplicación de 14 días.

PERIODO DE REINGRESO:

Esperar 24 horas luego de la aplicación antes de reingresar al área tratada.

COMPATIBILIDAD:

Fortress™ es compatible con la mayoría de plaguicidas, reguladores de crecimiento, micronutrientes y coadyuvantes agrícolas. No mezclar con materiales oxidantes, básicos o ácidos fuertes.

FITOTOXICIDAD:

No es fitotóxico a las dosis recomendadas.



FortressTM

Etiqueta Web - Perú

FUNGICIDA AGRÍCOLA SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones aquí dadas.



Fortress™

Etiqueta Web - Perú

FUNGICIDA AGRÍCOLA SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

Ligeramente peligroso por vía oral y dermal, no exponerse directamente al producto, usar equipo de protección a la piel. Tóxico por ingestión.

Ligeramente irritante al tracto respiratorio, usar equipo de protección respiratoria.

Ligeramente irritante a los ojos.

No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.

Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.

No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.

Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.

Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.

No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.

Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

Manténgase alejado del calor y del fuego.

No reutilizar el envase vacío para almacenar alimentos ni bebidas.

PRIMEROS AUXILIOS

Grupo Químico: Phenoxyquinolina.

En caso de intoxicación por ingestión, llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta y hoja informativa adjunta.

En caso de intoxicación por inhalación, mover a la persona al aire libre. Si respira con dificultad, suminístrese oxígeno o respiración artificial.

En caso de contacto con los ojos, lavarse con abundante agua

durante 15 minutos, en caso de contacto con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.

En caso de ingestión, no provocar el vómito. Se recomienda dar al paciente 30 mL de Sulfato de Magnesio oralmente, vea a un médico inmediatamente.

Teléfonos de EMERGENCIA, llamar al 0800-13-040 CICOTOX ó al 0800-50-847 CISPROQUIM ó al 0801-10200 Aló EsSalud.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de la aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin, Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

Peligroso para organismos acuáticos.

No contaminar ríos estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.

No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.

Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.

Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre, no permita animales en el área tratada.

El aplicador debe de emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.

En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

